

Anker[®] Implant

Anker系列植體選用來自美國符合ASTM F67-06與F136-08標準的材料，其抗張強度高於標準35%，且通過各項生物相容性的測試。

材料生產國：美國 

高雄醫學大學、台北醫學大學
中山醫學大學、高雄榮民總醫院
成大醫院、若瑟醫院、大同醫院
慈濟醫院 等各大醫院使用Anker
植體。



2021年
台灣精品
TAIWAN EXCELLENCE



2024年
藥物科技研究發展獎
製造技術類-銀質獎



2025年
台灣金根獎



FDA NMPA TFDA

衛人 教工 手植 冊牙

什麼是人工植牙

植牙手術安全嗎

植牙有哪些優點

缺牙與失智的關聯，是真的嗎？

根據《Journal of the American Geriatrics Society》在2021年發表的一項大型研究統計，共分析了來自24個研究、超過36,000名老年人的資料，結果發現：

- 缺牙數越多，失智風險越高
- 完全無牙者罹患失智症的機率，比擁有完整牙齒者高出約1.5倍

為什麼缺牙會影響大腦？



1. 咀嚼能力下降：

缺牙會影響咀嚼效率，導致營養攝取不足，特別是對大腦健康很重要的Omega-3脂肪酸、維生素B群等營養素。

2. 腦部刺激減少：

咀嚼本身是一種促進大腦活動的行為，能刺激海馬迴（負責記憶的區域）。牙齒減少→咀嚼少了→腦部活動也可能隨之降低。

3. 慢性發炎：

牙周病是缺牙的主要原因之一，而牙周病會造成全身性發炎反應，這種慢性發炎也被視為失智症的危險因子。

人工植牙 優點

- 單缺牙時，可以單支人工牙根重建，無須將鄰牙磨損
- 多顆缺牙時，可利用多支人工牙根支撐固定假牙
- 咀嚼能力恢復，就像是自己的牙齒一樣
- 不會有因使用假牙時造成的口腔粘膜的磨損
- 降低因活動假牙施力不均所造成齒槽骨萎縮
- 不會有全口活動假牙使用上的不適感
- 減少牙冠造成食物殘渣的殘留
- 容易清潔，沒有將活動假牙取出清潔時的不便

植牙須經專業牙醫師處置
建議先行與您的牙醫師，進行術前討論與評估

缺牙不只是口腔問題？ 小心失智症悄悄上身！

你知道嗎？缺牙不僅影響咀嚼、外貌與說話功能，近年來越來越多研究指出，缺牙也可能增加罹患失智症的風險！

該怎麼做？ 保住牙齒！

守住記憶！



還在為缺牙苦惱嗎？
現在您有更好的選擇

本資料僅供牙醫院診所植牙衛教使用



f Anker Implant

alliance


0800-255-099

什麼是人工植牙

所謂的人工植牙是將鈦金屬的人工牙根放置於齒槽骨內，待傷口癒合，再經過3至6個月的骨整合時期，使鈦金屬植體和周圍的齒槽骨完全結合後即可接上假牙。

不會有製造牙橋而磨損自然鄰牙的困擾，也沒有活動假牙使用的不便，亦可擁有自然且近乎真牙的假牙。

並達到高度的堅固性和承受咀嚼時的咬合力，讓您重拾信心可以盡情的大快朵頤！



植牙手術安全嗎



植牙是一項相對安全且成熟的牙科手術。純鈦的人工牙根具有高度的生物相容性，可促進骨整合，減少排斥反應，可長期安全留在體內。

當然，任何醫療行為都有一定風險，但在經由專業醫師評估口腔條件、擬定完整治療計畫後進行植牙，再加上患者在術後能確實配合醫囑，做好口腔清潔衛生與傷口照護，以及良好的生活習慣，植牙的成功率可達95%以上！

植牙在技術成熟和醫師專業的前提下，是相對安全的治療方式。然而，患者應充分了解植牙的風險，並與牙醫師充分溝通，才能做出最適合自己的決定。

選擇植牙，就是為了更健康、更自信的自己！用安心的方式，找回屬於您的幸福生活！

治療流程

▼ 初診

提出訴求，並讓醫師可以基本瞭解口內狀況以便為植牙手術提早治療與預防。

▼ X光片評估

X光片拍攝可以有效的協助醫師針對患者的牙床骨骼狀況有進一步的瞭解。

▼ 病史評估

詳細提供過去病史或現在的健康狀況，以及慢性藥物的服用情形，可以讓植牙手術的安全維護更加倍有效。

▼ 植牙手術計畫

醫師會進一步針對您的療程擬定詳細的計畫。包含植牙顆數、手術方式、附加治療項目(如補骨、鼻竇增高術、再生膜的使用)，手術和拆線時間安排。

▼ 手術當日

手術前: 血壓測量，同意單簽署和手術流程解釋。
手術後: 術後照護細節說明、拆線時間預約。

▼ 術後定期追蹤

術後除了回診拆線以外，還需要定期回診追蹤，以確保手術後恢復狀況良好，並有效提升植牙成功率。

▼ 假牙製作/安裝

耐心配合醫師取牙模的過程。假牙製作完成並安裝後，還須謹記醫師的叮嚀，好好維護並定期回診檢查。

一般植牙治療步驟



客製化的假牙型式



術後照護

1

按時服藥、追蹤

手術後依醫師的指示服用藥物，回診追蹤及拆線，醫師會依傷口照護需求開立漱口水，切勿自行停藥或減少劑量。

2

冰敷

手術後會有腫脹疼痛的感覺(冰敷15分鐘休息15分鐘)。手術當天可能會有滲血的情形，只要沒有持續出血的情形就毋須太擔心。但若有任何疑問，都可以和診所聯繫詢問。48-72小時候若有腫脹，可改熱敷(約50度)，每次15-20分鐘，每天3-4次。



3

拆線、維持口腔清潔

手術後拆線前仍需維持良好的口腔清潔習慣，為避免刺激傷口引起出血，可使用紗布或棉棒沾水擦拭手術範圍，口腔其餘的範圍仍需以牙刷、牙線正確的清潔。

4

充分休息、避免禁食食物及激烈運動

充足的休息，避免熬夜，勞累及抽菸飲酒或激烈運動，以免影響傷口的癒合。不要吃過硬、過熱、辛辣或刺激性的食物。

5

定期回診

視情況而定，一般5-7天可回診拆線。若有任何因手術引起的問題，請立即與醫師聯絡。

植牙後的保養與維護

植牙後的保養非常重要，可以確保植牙的成功和長壽。除了術後的飲食和清潔，定期回診檢查也是關鍵。

植牙後的保養要點

口腔清潔

使用軟毛牙刷，輕柔地刷洗植牙周圍的牙齦和牙齒。使用牙線或牙間刷清潔植牙和牙齦之間的縫隙。使用漱口水漱口，幫助殺死口腔細菌。避免過度用力刷牙，以免刺激傷口或損壞植體。

飲食調整

術後初期以流質或軟性食物為主，避免過熱、過熱或刺激性食物。避免啃咬堅硬食物，如堅果、芭樂、冰塊等，以免造成植體損壞。術後幾週內，避免抽菸、喝酒、嚼檳榔，以免影響傷口癒合。

定期回診

按照醫師指示，定期回診追蹤植牙狀況。及早發現和處理可能出現的問題，如植體周圍炎等。

其他注意事項

術後幾天內，避免劇烈運動，以免影響傷口癒合。術後腫脹和瘀青是正常現象，可以冰敷舒緩。如有持續出血或疼痛，應盡快諮詢醫師。